

NAATRIUMTIOSULFAAT

Kasutamine	Tsüaniidimürgistus. Võib manustada ka empiiriliselts tsüaniidimürgistuse kahtluse korral. N ja S sinepigaasi (sulphur ja nitrogen mustard e mekloreтамиин - antineoplastilised ained, mida kasutatakse tsütotoksilise kemoteraapia korral ja ka närvimürkidenamilitaarsetel eesmärkidel) mürgistuste korral.
Farmakokineetika	I/v manustamisel peaks kliiniline toime olema märgatav esimese 0,5 h jooksul. Tsüaniidimürgistuse sümptomid taanduvad 24-48 h jooksul.
Rasedus ja imetamine	FDA kategooria C. Ei ole vastunäidustatud lühiaegseks kasutamiseks ägeda, väljendunud sümptomaatikaga rasedatel patsientidel.
Annustamine	Täiskasvanud: 12,5 g i/v (50 ml-s 25% lahusena) 10 min jooksul. Lapsed: 400 mg/kg (1,6 ml/kg 25% lahusena). Ebapiisava kliinilise efekti korral võib 30 min möödudes manustada poole esialgsest annusest.
Vastunäidustused	Teadaolev ülitundlikkus tiosulfaadi suhtes.
Kõrvaltoimed	Madala toksilisusega. Võib põhjustada kontaktdermatiiti, diarröad. I/v manustamisel on põhjustanud põletustunnet, lihasspasme, iiveldust, oksendamist.