

RÄSTIKUMÜRGI ANTISEERUMID: VIPERA Tab

Kasutamine	<p>Euroopa rästiku hammustusest põhjustatud raske või keskmise raskusega mürgistus.</p> <p>Näidustused:</p> <p>Kiiresti leviv ulatuslik turse.</p> <p>Ravile halvasti reageerivad kardiovaskulaarsed sümptomid (kardiogeense šoki kujunemine).</p> <p>Kauakestvad ja intensiivsed kõhuvalud ning oksendamine.</p> <p>Rästikuhammustus näo-kaelapiirkonda, koos kiiresti kujuneva angioödeemi ja hingamisraskusega.</p> <p>Ebaselgete juhtumite korral pooldavad vastumürgi manustamist järgmised faktorid:</p> <ul style="list-style-type: none">• varane leukotsütoos (> 15-20x10⁹/L)• metaboolne atsidoos• hemolüüs• EKG-muutused• hüübivushäired
Rasedus ja imetamine	<p>ViperaTab on lastele ja rasedatele kõige sobivam rästikumürgi antidoot. Rinnapiima eritumise kohta puudub informatsioon</p>
Annustamine	<p>Antidoot on mõeldud vaid i/v manustamiseks 2 h jooksul peale rästikuhammustust.</p> <p>Täiskasvanud ja lapsed: sõltumata patsiendi vanusest ja kaalust on annus 200 mg Fab-fragmenti (so 2 ViperaTAB-i pudelit), mis tuleb manustada i/v infusioonina 30 min jooksul. Kui soovitud efekti ei saavutatud, turse suureneb või sümptomid taastekivad võib manustada 200 mg-se lisaannuse.</p> <p>Ravi Fab antiseerumiga on taastanud normaalse tsirkulatsiooni juba 30 min peale infusiooni teostamist.</p> <p>ViperaTAB-i pudel (100 mg) tuleb lahustada 5 ml-s steriilses vees (pakendiga kaasas), mille tulemusena tekib läbipaistev lahus, mis lisatakse 100 ml 0,9% NaCl-le. Kuna annustada tuleb 200 mg (2 pudelit) on manustatava lahuse hulk 200 ml. Lahus tuleb ära tarvitada kohe.</p>
Vastunäidustused	<p>Allergia lambavalkudele.</p>
Kõrvaltoimed	<p>Antidoodi korduval manustamisel on oht anafülaksia tekkeks. Teadaolevatel andmetel ei ole siiski reaktsioone esinenud.</p>