

## AMÜÜLNITRIT

<b>Kasutamine</b>	Sümptomaatiline tsüaniidimürgistus Ei ole soovitatav kasutada empiirilisel tulekahjuohvritel, kellel puudub otsene kahtlus tsüaniidimürgistusele. Võib osutada efektiivseks vesiniksulfiidimürgistuse korral juhtudel, mil ravimit on võimalik manustada esimese 30 min jooksul.
<b>Toime</b>	Tsüanomethemoglobiini moodustumise kaudu tsüaniidi sidumine organismis ja mitokondriaalse raku hingamise taastamine.
<b>Annustamine</b>	<u>Täiskasvanud</u> : Ampull (0,3 ml) avada, piserdada tampoonile ja patsiendi poolt inhaleerida 30 sekundit, siis teha 30 sekundit vaheaeg, seejärel korrata. Iga ampulli toime kestab 2-3 minutit. Maksimaalselt võib kasutada kuni kuus 0,3 ml ampulli. Purustatud ampulli võib hoida spontaanselt hingaval patsiendil suu ja nina juures. Purustatud ampulli võib panna ka ambukoti või maski sisse.
<b>Kasutamine rasedatel</b>	Nitritid võivad halvendada loote verevarustust ja indutseerida loote methemoglobineemia teket. Rasedatel on nitriteid lubatud kasutada lühiaegselt ägeda tsüaniidimürgistuse korral. Andmed rinnapiima eritumise kohta puuduvad.
<b>Vastunäidustused</b>	Väljendunud methemoglobineemia (üle 40%); Raske hüpotensioon (nitritid võivad süvendada hüpotensiooni); Kaasuv CO-mürgistus
<b>Kõrvaltoimed</b>	Methemoglobineemia, hüpotensioon, peavalu, nahapunetus, uimasus, iiveldus, oksendamine, tahhükardia, higistamine